

LARVAFIN® (i.a. Pyriproxyfen 0.5% GR)

I. IDENTIDAD

Nombre comercial	LARVAFIN®
Ingrediente Activo	Piriproxyfen
Concentración	0.5 %
Formulación	Granulado (GR)
Clase de uso	Insecticida - Análogo de la hormona juvenil.
Grupo químico	Análogo de la hormona juvenil
Categoría toxicológica	Ligeramente peligroso - Cuidado (III)
Resolución Directoral	R.D. N° 0237-2018/DCEA/DIGESA/SA
Titular del Registro, Fabricante y Comercializador	SILVESTRE PERU S.A.C.

II. CARACTERISTICAS

Mecanismo y modo de acción.	LARVAFIN® se comporta como un regulador de crecimiento de los insectos (RCI) del tipo juvenoide, evitando el desarrollo normal de la morfogénesis, reproducción y embriogénesis de los insectos; impidiendo la transformación final de los estadios pre adulto y adulto.
-----------------------------	---

III. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Consideraciones durante la Preparación y aplicación	<p>Aplicar 2g / Cilindro de 200 L de agua. En contenedores de agua destinadas para consumo humano.</p> <p>Aplicar 2 a 10 g de LARVAFIN® por cada m³ de agua a tratar, lo cual significa una concentración final de 0.01-0.05 ppm de i.a. (Piriproxyfen)</p> <p>Para la aplicación de LARVAFIN® en agua estancada el volumen de agua a tratar debe ser calculada empleando la siguiente formula:</p> <p>Volumen de agua a tratar (m³) = superficie del área (m²) *profundidad media (m)</p>
---	---

	FICHA TÉCNICA	Revisión: 00 Aprobado: JT Fecha: 28-01-2020 Página: 2 de 2
		

Dosis y Recomendaciones de uso	
Tratamiento de agua para consumo humano:	2g/Cilindro de 200 L de agua
Tratamiento de agua estancada.	2 a 10 g de LARVAFIN® por cada m3 de agua a tratar.
IV. USO SEGURO DEL PRODUCTO	
Precauciones	<p>LARVAFIN® es un producto ligeramente peligroso, por lo que deben presentarse las siguientes precauciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa. Mantener el producto en el envase original. Abrir el envase al momento de utilizarse. • Utilizar el equipo de protección personal (EPP) adecuado durante el manipuleo y la aplicación del producto. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas o forrajes. • Almacenar el producto en lugar sombreado, seco y bien ventilado, en sus envases originales bien cerrados. • No existe antídoto específico, usar tratamiento sintomático.
Manejo y disposición de desechos y envases vacíos	<ul style="list-style-type: none"> • Después de usar el contenido destruya el envase y déjelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.